

Maurice PIC


DIVERSITÉS ENTOMOLOGIQUES

(10 JUIN 1947)

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHIEN, 15





DIVERSITÉS ENTOMOLOGIQUES

Deux publications entomologiques anciennes, dont je fus le promoteur et l'éditeur, n'ont plus de raisons de paraître : je les juge périmées avec les temps révolus.

Faut-il les rappeler ?

L'une porte le titre qui, pour commencer, fut quelque peu raillé par les esprits forts, de « *Mélanges exotico-entomologiques* » et sonne mal à l'oreille du poète que je puis être à l'occasion ; je l'ai abandonné, sans trop de regrets, pendant la guerre, pour éviter l'humiliation possible d'un refus d'autorisation d'imprimer.

Pour remplacer la brochure, arrêtée au 71^e fascicule, « *Opuscula martialis* » (ouvrage de circonstance, édité comme supplément du journal *L'Echange* autorisé), a vu le jour, mais, la guerre terminée, son titre d'en-tête ne convenait plus ; cette deuxième publication doit être à son tour reléguée au rang des choses passées, arrêtée au fascicule 13.

Toujours actif, malgré mon âge avancé, *L'Echange* ne suffit pas à absorber mon activité productive et descriptive et les articles inédits, les descriptions rédigées continuent à traîner nombreuses en me désespérant.

Il ne faut pas trop compter aujourd'hui sur un voisin (périodique ancien, journal nouveau) pour vous décongestionner, car la crise pécuniaire sévit et certaines rédactions vous apparaissent plus préoccupées de récupérer des cotisations élevées, ou de solliciter des contributions volontaires, que d'imprimer vos articles.

Après avoir hésité un certain temps, effrayé par les frais actuels de publication, je me suis cependant décidé à tenter le coup dur et à lancer ma création d'après-guerre, toute empreinte d'idées pacifiques : « *Diversités Entomologiques* ». Son titre n'est pas compromettant, simple ; il permet de tout entreprendre sans sortir du sujet et j'ose espérer qu'il sera exempt de toute critique. Prudent, je ne promets pas que le 1^{er} fascicule sera bientôt suivi d'un second. L'incertitude du lendemain doit vous rendre perplexe et calmer sagement votre ardeur ; en surplus, les disponibilités dont je dispose sont modestes et ne me permettent qu'un coup d'aile passager.

Pour commencer, dans ce premier fascicule, j'irai au plus pressé et ferai connaître une série de formes nouvelles de Coléoptères, de diverses familles, et toutes dans ma collection.

Glaphyrus purpureus n. sp. ♂ [Lamellicorne]. Oblongo-elongatus, griseo pubescens, aurato-purpureus, pedibus pro majore parte rufis ; epistome tridentato ; thorace elongato, dense et irregulariter punctato ; elytris sat latis, apice subsinuate rotundatis, paulo dehiscentibus, distincte callosis, parum dense pro parte lineato-pubescentibus ; femoribus posticis, valde dilatatis. Long. 12 m. Perse. — Paraît voisin de *superbus* Chp. et reconnaissable par sa coloration presque uniformément dorée-pourprée sur tout le corps.

Une ♀ (*incertus mihi*), de Perse, que je rapporte provisoirement à *oxypterus* Pall. comme variété, a 12 m. de longueur, les élytres nettement acuminés sans être très pointus à l'extrémité, ayant une coloration particulière sur le dessus, pourprée sur l'avant-corps, verte sur les élytres avec des reflets pourprés par places sous certains jours.

J'attribue à *Ptinus testaceus* Ol., sous le nom de **v. nigrinus**, une ♀ paraissant épilée, originaire de la Vienne ;

de coloration générale noire, avec les pattes roussâtres, sans touffes de poils au thorax, qui est orné d'une granulation rapprochée, avec la tête et l'écusson nettement pubescents de jaune, les élytres d'une forme ovale un peu allongée.

Brounicyphon n. g. [Dascillide]. Capite antice prolongato (mandibulis maximis), inter antennis non elevato ; oculis sat minutis, valde distantibus ; antennis gracilibus et elongatis, articulo 1° crasso, 2° breve, sequentibus valde longioribus ; thorace breve et lato, medio sulcato ; elytris thorace valde latioribus, supra paulo depressis, costulatis, apice attenuatis ; pedibus parum validis, diverse pubescentibus. Faciès de *Macrocyphon* Pic, s'en distingue, à première vue, par la structure du thorax, celui-ci proportionnellement plus étroit que les élytres, la pubescence soyeuse non continue de ces derniers. Etabli pour l'espèce nouvelle suivante.

B. sericicum n. sp. Grandis, oblongo-elongatus, parum nitidus, griseo-luteo sericeo diverse pubescens, rufus, pro parte castaneus, membris pallidioribus, minute et densissime punctatus ; thorace transverso, antice et postice sinuato, lateraliter marginato, subarcuato, angulis non prominulis ; elytris latis, sat elongatis, apice attenuatis, in singulo tricostatis, lateraliter paulo marginatis, sutura minute marginata. Long. 8 m. Nouvelle-Zélande.

Ectopria Grouvellei n. sp. [Dascillide]. Subovatus, postice latior, parum nitidus, concolor, rufus, oculis nigris, grandis, parum distantibus ; thorace breve et lato, minute et sparse punctato, antice attenuato, postice supra arcuate impresso ; elytris antice thorace non latioribus, postice latioribus, apice breve attenuatis, marginatis, humeris prominulis, inæquale punctatis et pro parte reducte plicatis. Long. 3,5 m. Brésil.

Chilectopria s. g. de *Ectopria* Lec., à séparer par les tarses tout à fait grêles et très longs, leurs crochets très

longs, simples, seulement un peu élargis à la base, dessus du corps inégal avec des impressions ; s. g. établi pour l'espèce suivante.

Chilectopria grandis n. sp. Oblongo-subovatus, parum nitidus, minute griseo pubescens, nigro-piceus aut paulo rufescens, supra vage æneo-metallescens, humeris luteo maculatis, membris et abdomine circa testaceis, scutello rufo. Long. 7 m. Chili.

Eubrianax luteosignatus n. sp. [Dascillide]. Subovatus, parum convexus, niger, elytris lineis luteis multi et irregulariter dispositis, his pro parte junctis et brevibus ; thorace et scutello luteo marginatis, pedibus testaceis. antennis flabellatis. Long. 3,6 m. Chili. — Espèce très caractérisée par les dessins jaunes irréguliers des élytres.

Ptilodactyla Theresæ n. sp. [Helodide]. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, pubescens, niger, tarsi apice rufis ; thorace particulare, lateraliter postice recte truncato, elytris angustiore, diverse granuloso ; elytris subconvexis, marginatis, fortiter, lateraliter incomplete, striatis-punctatis, intervallis pro parte subconvexis, minutissime punctatis. Long. 7,5 m. Brésil. — Espèce très caractérisée par son thorax particulier, joint à la forte sculpture élytrale.

P. luteitarsis n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, pubescens, niger, pro parte piceus, antennis tarsisque luteis ; thorace parum breve, elytris paulo angustiore, minute punctato, lateraliter postice subemarginato ; elytris ad suturam antice paulo impressis, pro parte oblique et distincte striatis, intervallis deplanatis, minutissime punctatis. L. 8 m. Pérou. — Voisin du précédent.

P. truncaticollis n. sp., du Pérou, voisin du précédent, est moins fortement atténué en arrière, avec les stries élytrales faibles ; le thorax, plus transversal, est nettement tronqué sur son milieu antérieur. L. 8 m.

Philocalus angustefasciatus (1) mihi [Cleride]. Elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens et hirsutus, niger, thorace rubro, elytris post medium anguste et parum distincte flavo-fasciatis. L. 5 m. Rhodesia. — Paraît voisin de *succinctus* Kl., en diffère par la tête foncée, les élytres foncés à la base et ornés d'une très étroite bande flavo.

Prosymnus viridescens mihi [Cleride]. Oblongo-elongatus, nitidus, supra nigro hirsutus, viride metallicus, infra corpore membrisque testaceis. L. 10 m. Tanganyka. — Espèce caractérisée par sa coloration conjointement à sa forme relativement allongée.

Opetiopampus Fritzi mihi [Cleride]. Oblongus, nitidus, sparse griseo pubescens et fusco hirsutus, testaceus, oculis, clava antennarum, elytris, pectore abdomineque nigris. L. 4 m. Afr. M^e. — Espèce très caractérisée par sa ponctuation pupilleuse et écartée sur l'avant-corps ; peut se placer dans le voisinage de *collaris* Sch.

Necrobinus inæqualis mihi [Cleride]. Oblongus, griseo et fusco hirsutus, nitidus, nigro-metallicus, supra vage ænescens, antennis ad basin testaceis. L. 4 m. Le Cap. — Cette espèce est bien caractérisée par la forme du thorax (cet organe est court, étranglé, antérieurement et postérieurement, crénelé sur les côtés, avec les angles marqués, dessus inégalement sculpté) et la sculpture inégale des élytres qui sont en partie fortement impressionnés ponctués avec d'autres impressions creusées et ont quelques fascicules pileux.

Silidius Theresæ n. sp. [Malacoderme]. Elongatus, parum nitidus, rufus, elytris pallidioribus, his ante apicem in disco reducte nigro vittatis, vitta antice attenuata,

(1) Cette espèce, et les trois autres qui suivent, figurent, plus longuement décrites, dans un article envoyé au Musée de Dahlem en 1939 et dont je n'ai aucune nouvelle.

membris nigris, femoribus ad basin rufis. L. 9 m. Afr. Or.
— Caractérisé par un dessin élytral particulier et à placer près de *atromaculatus* Pic.

S. atriventris n. sp. Elongatus, parum nitidus, rufotestaceus, capite, antennis, abdomine, elytris apice, tibiis aliquot pro parte tarsisque nigris. L. 9-10 m. Congo : Kivu. — A placer près de *multinotatus* Pic, plus grand et de coloration différente.

S. robusticeps mihi, du Congo, est plus petit, plus largement noir au sommet des élytres avec les pattes claires, sauf parfois les tarses un peu rembrunis, le thorax ♂ est transversal, largement échancré près de la base avec 2 petits lobes juxtaposés. L. 7 m.

S. sinuatus n. sp. ♂. Elongatus, postice paulo latior, apice attenuatus, parum nitidus, niger, thorace aurantiaco et medio nigro lineato, parum lato, postice lateraliter paulo inciso, angulis posticis parum distinctis ; elytris aurantiacis, apice nigro sinuatis, distincte costatis. L. 10 m., Afr. Or. — Voisin de *lineaticollis* Pic, caractérisé par la macule apicale noire des élytres sinuée antérieurement.

S. bogosensis n. sp. ♂. Parum elongatus, subparallelus, paulo nitidus, niger, abdomine elytrisque luteis, his apice late nigris ; thorace ad medium latiore, postice attenuato et lateraliter sinuato ; elytris minute et dense punctatis, vage costulatis. L. 7 m. Erythrée. — Voisin de *atrinotatus* Pic, caractérisé par la forme de son thorax.

Plusieurs insectes du Congo, par la structure abdominale des ♂, à élytres noirs bordés complètement de clair, mais avec l'avant-corps variable, me paraissent devoir être rapportés à *Elisabethæ* Pic ; ce sont : tête et thorax rougeâtres, concolores (v. n. *immaculatus*) ; tête et thorax rougeâtres, tous deux maculés de foncé (v. n. *quadrinotatus*) ; thorax seulement bimaçulé de foncé (v. n. *bima-*

culatus), ou thorax marqué largement de noir sur le disque (v. n. *disconotatus*).

Cyparium peruvianum n. sp. [Scaphidiide]. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, capite antice, thorace postice angustato, scutello et infra corpore pro parte rufis, membris et pygidio apice testaceis ; minime punctatus, stria suturalis parum distincta. L. 3 m. Pérou. — A placer près de *Sallei* Mat.

Heteroscapa atripenne [Scaphidiide] mihi, de Sumatra, voisin de *Grouvellei* Ach., est noir, très brillant, avec les membres roux, la strie présuturale profonde, à grosse ponctuation peu écartée, nette, quoique plus petite au sommet des élytres. L. 3 m.

H. Jacobsoni n. sp. Un peu allongé, roux, à strie présuturale profonde, élytres avec des points assez forts et écartés, s'effaçant, ou diminuant, au sommet. L. 2 m. Sumatra. — Voisin de *minutum* Ach., élytres autrement ponctués.

Zonabris semivittata n. sp. [Vésicant]. Angustatus, diverse nigro hirsutus, niger, supra et infra paulo viride tinctus, elytris in singulo et in disco antice longitudinaliter luteo vittatis et ante apicem reducte oblique luteo sinuato fasciatis ; thorace sat minute et sparse punctato ; antennis sat elongatis, articulo ultimo elongato, acuminato. L. 8 m. Asie C^{le}. — A placer près de *splendidula* Pal., en diffère par le dessin des élytres particulier avec la teinte verdâtre peu prononcée sur le dessus du corps.

Z. Doriæ v. n. Daligandi. Elytres ayant chacun les dessins jaunes suivants : une bordure antérieure sinuée externe arquée en arrière, une fascie basale, une macule présuturale antémédiane, une fascie apicale avec points verts. Perse.

Z. Frolovi v. n. sexguttata. Noir bleu avec chaque élytre ornée des dessins jaunes suivants : 3 petites ma-

cules, 2 basales juxtaposées, la 3^e médiane discale, en plus une fascie sinuée postérieure. Buchara.


Macrosiagon notatum n. sp. [Hétér.]. Angustatus, postice attenuatus, parum nitidus, rufo-testaceus, elytris nigris, ad basin in singulo breve luteo lineatis, linea humeralis externa longiora, linea discoidalis paulo obliqua, geniculis nigris. L. 8 m. Mauritanie. — Voisin de *bicolor* Cast. (peut-être simple var. ?) avec le dessous du corps entièrement clair et les élytres ornés de lignes jaunes antérieures.

M. bicolor v. n. **Perroudi**, du Sénégal, présente une ligne basale externe rousse sur chaque élytre.

M. longithorax n. sp. Elongatus, sat angustatus, parum nitidus, rufus, antennis apice nigris, his pectinatis ; capite postice arcuato, minute et sparse punctato, rufo, pro parte obscuro ; thorace longissimo, antice attenuato, minute et dense punctato, ad basin deplanato ; elytris minute et dense punctatis, parum elongatis, apice paulo dehiscentibus et externe acuminatis. L. 7 m. Congo. — Espèce caractérisée par la grande longueur du thorax comparativement à celle des élytres. Par sa forme ressemble un peu, en moins allongé, à un insecte de l'Uganda (communiqué autrefois par le British Museum), et que j'ai appelé *longicolle*, long de 4 mill., noir avec les élytres testacés, ayant la tête très brillante et le thorax très long.

Leptaleus Klugi v. n. **obscurior** [Hétér.]. Supra nigrescens, elytris ad humeros breve luteo maculatis et postice luteo fasciatis. Sénégal.

Anthicus insignifer n. sp. [Hétér.]. Oblongus, nitidus, convexus, parum pubescens, rufo-testaceus ; capite lato, postice subarcuato, fortiter punctato ; thorace breve, antice dilatato-subrotundato, fortiter sat dense punctato ; elytris latis et brevibus, fortiter punctatis, antice parum depressis, postice ad suturam impressis. L. 3 m. Sénégal. — Voisin de *rugithorax* Pic, avec l'avant-corps moins



densément et plus fortement ponctué, la coloration plus claire.

A. angolensis n. sp. Oblongus, convexus, nitidus, sparse pubescens, niger, elytris ad basin et postice intus luteo maculatis, postice et apice luteo marginatis, membris testaceis; capite robusto, postice arcuato, sat fortiter et sparse punctato; thorace breve, antice dilatate-subrotundato, sat fortiter non dense punctato; elytris latis et brevibus, fortiter punctatis, antice paulo depressis. L. 3,5 m. Angola. — Voisin du précédent avec une coloration élytrale particulière.

A. brunneosignatus n. sp. Oblongus, nitidus, parum pubescens, rufo-testaceus, membris pallidioribus, elytris postice ad suturam breve brunneo maculatis; capite post oculos attenuato et arcuato, minute et sparse punctato, thorace sat breve, antice dilatate-subrotundato, ad basin externe impresso, minute et sparse punctato; elytris latis, sat brevibus, supra non convexus, ad basin paulo depressis, minute et sparse punctatis. L. 2 mill. environ. Zanguebar. — Ressemble à *subnotatipennis* Pic, en diffère par la tête nettement rétrécie derrière les yeux, les élytres moins allongés, à signe brunâtre non allongé.

Bancocistela arcuatitarsis n. sp. [Hétér.]. Elongatus, niger aut piceus, elytris nigro-subæneis, ad basin et ad suturam testaceis; antennis sat elongatis; articulis ultimis tarsarum arcuatis, in pedibus anticis longissimis. L. 5 m. Sénégal. — Sculpture de *ivoirensis* Pic, en différent, en outre de la coloration, par les antennes moins courtes et le très long article à crochet des tarses antérieurs.

Allecula (1) *dakarensis* mihi, oblong-allongé avec

(1) Je retrouve parfois dans mes cartons et nommées anciennement des espèces diverses, telles que divers *Allecula*, pour lesquelles je n'ai pas noté de références bibliographiques, je les suppose inédites.

l'avant-corps densément ponctué, les élytres longs et fortement striés, a les membres noirs, l'avant-corps d'un roux brunâtre et les élytres roux. L. 4 m. Sénégal. — De forme moins allongée que *subnigra* Pic, avec les antennes toutes noires, les pattes noires sauf les cuisses rousses à leur base.

A. Bodongi n. sp. Oblongus, sat robustus, rufus, infra corpore nigro, membris luteis, antennis apice et femoribus apice nigris ; capite thoraceque dense punctatis, illo lato ; elytris thorace valde latioribus, apice attenuatis, fortiter striatis, intervallis convexis ; femoribus parum crassis. L. 7 m. Beira. — A placer près de *dentatipes* Pic, moins allongé, thorax déprimé, etc.

A. Alberti mihi, de Fort Sibut, ♀, est plus allongé que le précédent, noir avec les membres jaunes sauf les genoux noirs, les élytres sont faiblement rétrécis en avant, fortement striés, le thorax bien plus étroit que les élytres, est densément ponctué. L. 8 m.

A. Le Testui mihi, du Gabon, ♂, de forme allongée et coloration généralement roussâtre, a les membres noirs avec les cuisses largement jaunes à la base, les tibias antérieurs sont munis d'une petite dent, les intermédiaires presque droits, le thorax est nettement plus étroit que les élytres, densément ponctué, les élytres sont peu fortement striés, très atténués postérieurement ; l'appareil génital comprend deux pincés un peu creuses, dentées vers leur milieu et, entre elles, se montre un long style coudé avant l'extrémité et appointé au sommet. L. 12 m. — Voisin de *puberula* Frm.

A. opacoscricea n. sp. Elongatus, fere opacus, breve, parum dense albo-sericeo pubescens, niger, capite thoraceque densissime punctatis ; elytris thorace latioribus, elongatis, apice attenuatis, minute striatis, inervallis dense minute granulatis. L. 9 m. Congo. — Caractérisé par

son fin revêtement avec l'aspect non brillant et la coloration générale noire.

A. subsericea n. sp. Angustatus, depressus, parum nitidus, minute sericeo pubescens, rufus, membris luteis, articulis tribus ultimis antennarum et femoribus apice diverse, aliquot paulo brunneo notatis, nigris; thorace elytris paulo angustiore, dense punctato; elytris apice attenuatis, mediocre punctato-striatis, intervallis minute punctatis. L. 6-7 m. Tanganyka. — Plus allongé que *Conradsii* Pic avec les stries plus nettes.

A. Conradsii v. n. tanganykana est un peu plus large et plus grand, les yeux sont moins écartés que chez la forme typique. Tanganyka.

A. angolensis mihi, de l'Angola, à coloration générale rousse avec les membres en partie noirs (base des antennes et cuisses largement rousses), de forme allongée. ayant de faibles stries élytrales, le thorax un peu plus étroit que les élytres, est bien caractérisé par ce dernier organe obconique, muni d'une ponctuation espacée. L. 8 m.

Xenogena Theresæ n. sp. [Hétér.]. Oblongo-elongatus, parum nitidus, hirsutus, rufus, elytris pallidioribus, membris nigris, antennis femoribusque ad basin rufis; antennis elongatis, non crassis, articulo ultimo sat elongato, apice subtruncate-acuminato; capite thoraceque dense punctatis; elytris elongatis, apice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis punctatis. L. 5,5 m. Congo. — Voisin de *Crampeli* Pic, moins court, avec les antennes plus longues, la tête non foncée. Dédiée, comme les autres nouveautés du nom de *Theresæ*, à la mémoire de ma femme.

X. Alluaudi mihi, d'Assinie, voisin du précédent et de coloration analogue, a le thorax plus large, les antennes plus robustes et plus courtes, avec le dernier article assez court, un peu arqué en dessous, subarqué au sommet.

X. Auberti n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, hirsutus, rufo-piceus, elytris pallidioribus; antennis nigris, robustis; capite fortiter et dense punctato, lateraliter subarcuato; elytris latis, parum elongatis, apice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, punctatis. L. 6 m. Gabon. — Voisin de *crassicornis* Pic, moins court, antennes moins épaisses, coloration moins claire sur l'avant-corps.

X. semiobscura mihi, de S.-Leone, voisin du précédent, a l'avant-corps franchement noir, fortement et densément ponctué, les élytres roux, assez courts. L. 7 m.

X. leonensis mihi, aussi de S.-Leone, est plus petit, ayant la tête noirâtre, le thorax roux un peu obscurci avec les élytres plus clairs, ces derniers étant plus larges et longs. L. 5 m.

X. laticeps n. sp. Robustus, oblongus, sat nitidus, niger, elytris rufescentibus; antennis nigris, robustis et brevibus; capite et thorace fortiter, pro parte dense, punctatis, elytris latis, postice latioribus, apice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis pro parte subconvexis, diverse punctatis; pedibus nigris. L. 7 m. Fort Sibut. — Coloration analogue à celle de *semiobscura* Pic, mais plus robuste avec l'avant-corps à ponctuation plus embrouillée.

Adynata minor n. sp. [Hétér.]. Minutus, nitidus, fere glaber, testaceus, capite nigro, antennis gracilibus, obscuris; capite minute et dense punctato; thorace parum lato, minute non dense punctato; elytris latis et brevibus, postice attenuatis, regulariter striatis, intervallis angustatis, fere lævibus. L. 4 m. Congo: Katanga. — Caractérisé par sa coloration générale claire, les stries régulières des élytres.

A. latipennis mihi, de Zanzibar, également de petite taille et voisin du précédent, est en majeure partie tes-

tacé, rembruni par places ; les élytres sont très larges, très atténués en arrière, régulièrement striés, les intervalles, assez étroits, sont finement ponctués. L. 4. m.

A. Conradsii n. sp. Oblongus, nitidus, fere glaber, niger aut piceus, thorace rufo, elytris pallidioribus, antennis nigris, articulis primis vage rufis, brevibus, parum crassis ; capite parum minute et dense punctato ; thorace breve et lato, lateraliter fere recto, sat minute, non dense punctato ; elytris latis et brevibus, post medium paulo latioribus et apice attenuatis, distincte striatis, intervallis angustatis et convexis, paulo punctatis. L. 5,5 m. Tanganyika (ex Conrads). — Ressemble à *subregularis* Pic comme forme, mais la sculpture élytrale est différente avec les stries régulières et bien marquées.

A. striatipennis mihi, du Tanganyika, voisin du précédent, est testacé, un peu rembruni par places sur les pattes et le dessous, avec la tête d'un roux obscur, les antennes noires, à base roussâtre ; le dernier article des antennes, long, est un peu sinué sur son côté antérieur. L. 4,5 m. — Peut se placer près de *ruficollis* Bor.

Glenea cyanescens n. sp. [Cerambyc.] Robustus, postice attenuatus, opacus, dense griseo cyanescente pubescens, elytris et infra corpore nigro notatis, membris nigris, pro parte pubescentibus ; capite parum robusto ; antennis parum brevibus ; thorace breve et lato, lateraliter antice subarcuato, postice paulo strangulato, medio carinato, minute et sparse punctato ; elytris ad humeros latis, sat brevibus, apice dentatis, in singulo et in disco ante medium nigro uni-maculatis, ante apicem vage nigro notatis. L. 15 m. Sumatra. — Espèce caractérisée par sa forme robuste et sa coloration.

G. trilineata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, fere opacus, niger, supra lineis et maculis viridescentibus ornatus, femoribus testaceis ; thorace medio et lateraliter

reducte lineato, scutello pubescente ; elytris in singulo quinque (2, 1, 1, 1) griseo-viride maculatis, sutura viridana, infra corpore pro majore parte dense pubescente. L. 10 m. Java. — Voisin de *Rouyeri* Pic, dessins du thorax différents, macules antérieures des élytres dissemblables, non arrondies.

G. multiinterrupta n. sp. Angustatus, nitidus, rufescens, capite thoraceque obscurioribus, infra corpore pro majore parte dense albo pubescente, supra griseo maculatus et lineatus ; capite in vertice bilineato ; thorace parum elongato, supra ad medium et lateraliter griseo lineato ; elytris in singulo, intus antice reducte lineatis, quadri (2 parum oblique dispositis, 1, 1) griseo maculatis, his sat elongatis, apice valde dentatis. L. 10 m. Annam. — Voisin de *pallidipes* Pic, plus allongé avec les dessins gris des élytres très interrompus.

G. Pici v. n. *rufotibialis*. Forme allongée, thorax relativement long, à bande médiane interrompue, tibiae postérieurs roux. Tonkin.

G. 6-maculata n. sp. Sat robustus, postice attenuatus, niger, elytris pro parte vage rufescentibus, in singulo sex maculis (2, 1, 1, 1, 1) griseis non regulariter dispositis. L. 11 m. Annam. — A placer près de *Pici* Aur., élytres moins foncés avec une macule en plus.

Lema viridicolor n. sp. [Phytophage]. Oblongus, nitidus, nigro-cyaneus, supra viride metallicus, membris cyaneis ; capite minute et sparse punctato, inter oculos sulcato ; thorace breve et lato, medio paulo strangulato, fere impunctato ; elytris latis, sat brevibus, postice latioribus, ante medium transverse et paulo depressis, minute lineato punctatis, punctis postice minutis. L. 7 m. Tonkin : Chapa. — Espèce bien caractérisée par ses larges élytres joints à sa coloration générale foncée.

L. javanensis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, supra vi-

ride-olivaceus ; capite inter oculos trisulcato ; thorace breve et lato, antice lateraliter paulo angulato, ad basin minute transverse multiplicato ; elytris latis et brevibus, lineato-punctatis, postice diverse et breve sulcatis, post basin paulo impressis. L. 5 m. Java. — A placer près de *hæmatomelas* Lac., mais autrement coloré.

L. mendesensis n. sp. Oblongus, testaceus (antennis fractis), tarsis nigris, thorace nigro bimaculato, elytris viridibus, complete testaceo marginatis, sat fortiter et dense striato-punctatis. L. 7 m. Brésil. — Espèce très caractérisée par sa sculpture et sa coloration élytrale ; à placer près de *limbata* Lac.

L. trinotata n. sp. Oblongus, rufus, antennis, femoribus apice, tibiis et tarsis nigris, elytris in singulo ad humeros et in disco ante medium nigro maculatis, post medium transverse et reducte nigro fasciatis, his paulo impressis, minute lineato-punctatis. Variat. : fascia oblitterata (v. n. *bisbipunctata*). L. 5 m. Colombie. — A placer près de *ricana* Pic.

L. rufohumeralis n. sp. Sat latus, niger, elytris ad humeros transverse rufo notatis ; thorace breve, paulo strangulato ; elytris latis et brevibus, paulo impressis, minute lineato-punctatis. L. 5 m. Brésil. — A placer près de *excavata* Pic.

L. tapiana n. sp. Oblongo-elongatus, rufus, membris elytrisque nigris, thorace nigro bimaculato, illo breve et lato ; elytris parum elongatis, antice paulo impressis, sat fortiter et pro parte irregulariter punctatis. L. 6 m. Pérou. — A placer près de *prescutellaris* Pic.

L. Viturati n. sp. Oblongus, rufus, capite, antennis, pectore, tibiis tarsisque nigris, elytris luteis, signaturis viridis ornatis : in singulo antice linea suturalis et linea humeralis lata, ante et post medium transverse fasciatis,

fascia prima ad lineas juncta. L. 7 m. Equateur. — A placer près de *durangosa* Pic.

L. ambatoensis n. sp. Oblongus, testaceus, capite, antennis, pectore, tibiis tarsisque nigris, elytris viridibus, apice late testaceis, antice testaceo marginatis. L. 7 m. Equateur. — Voisin de *peplophora* Lac.

L. de Gaullei mihi, du Pérou, diffère du précédent par les élytres plus longs, noirs, à peine teintés de verdâtre, la taille un peu plus grande avec la ponctuation plus fine aux élytres qui, en outre, sont presque indistinctement impressionnés.

L. obscurithorax n. sp. Oblongus, niger, capite inter oculos rufo notato, femoribus ad basin breve rufis, elytris rufis, apice late viride maculatis, sutura antice late viridis, in singulo ad humeros et ad medium in disco viride maculatis. L. 4 m. Montevideo. — Voisin de *d'Orbygnii* Guer. par le thorax foncé, dessins des élytres différents.

L. preapicalis mihi, du Tucuman, très voisin du précédent par sa coloration et ses dessins, se distingue par la présence, sur les élytres, d'une macule préapicale (et non apicale), la coloration des pattes moins foncée, avec les cuisses largement marquées de roux, les tibias antérieurs roussâtres à la base.

L. latejuncta n. sp. Oblongus, niger, capite (in vertice viride foveolato) postice thoraceque rufis, illo breve, postice paulo strangulato et sulcato, elytris intus late et sinuate, apice complete, cyaneis, externe sinuate rufis et ad humeros cyaneo maculatis. L. 4 m. R. Argentine. — Voisin de *dorsalis* Ol. avec des dessins foncés très étendus et joints, la tête ornée d'une fossette verte.

